

化學治療靜脈給藥注意事項

壹、為維護您在化學治療靜脈給藥時的安全與舒適，請注意以下事項：

一、化療前：

- (一)請穿著開前襟、寬袖(避免穿束袖口)的衣服，以方便評估注射部位。
- (二)治療前，請先解小便，需要時可將尿壺或便盆備於床旁，亦可將呼叫鈴放於身旁，以便使用。

二、化療中：

- (一)注射化學治療藥物時，若需下床，請務必維持管路固定，避免拉扯或折到。
- (二)減少注射針拉扯之動作，避免將手臂高舉過頭(圖一)、撿拾物品，請用未被注射的手做事(如:拿話筒)，如需穿脫衣服，請告知護理師協助更換。
- (三)注射化學治療藥物時，勿碰觸或磨擦靜脈注射週邊部位。
- (四)如有使用點滴幫浦控制滴數時，請勿自行調整機器，機器發出聲響時，請立刻通知護理師。
- (五)若您發現所使用的活動點滴架推起來不順暢，請立即向護理站反應。



圖一 注射部位管路維持通暢

三、化療後：

- (一)在化學治療靜脈給藥正常輸注時，注射部位應該不會感到疼痛或不舒服。假如有下列情形，請立即通知醫護人員或立即返回醫院處理：
 - 1. 注射部位有灼熱感、發紅、腫脹、刺痛感、導管

輸注座移位、皮膚有濕濕的感覺。

2. 點滴速度突然變得不流暢。

3. 靜脈管路有被扯動的情形。

(二)輸注結束後，觀察注射部位周圍皮膚至隔日，如有腫脹、發紅、局部發熱、疼痛等不適，請立即告知醫護人員或返回醫院處理。

貳、諮詢服務電話

(02) 89667000 轉 4001 (血液腫瘤科病房)

(02) 89669000 (預約掛號專線)

參、參考文獻：

張黎露、周文珊、江孟冠、王齡鈴、李宜恬、辜馨儀 (2022)·靜脈導管臨床照護指引，腫瘤護理雜誌，22，5-58。

https://doi.org/10.6880/TJON.202210/SP_22.01

Jan Buter, Katherine T Steele, Kevin C Chung, Kate Elzinga(2020)

Extravasation injury from chemotherapy and other non-antineoplastic vesicants, UpToDate. Retrieved May 12, 2021 from

https://www.uptodate.com/contents/extravasation-injury-from-chemotherapy-and-other-non-antineoplastic-vesicants?search=Extravasation%20injury&source=search_result&selectedTitle=1~82&usage_type=default&display_rank=1#H548740882

肆、複習一下

問題1：()滴注化學治療藥物時注射部位會痛，要跟護理師說？

問題2：()化學治療結束後，需觀察注射部位周圍皮膚至隔日，如有腫脹、發紅、局部發熱、疼痛等不適，請立即告知醫護人員或返回醫院處理。

問題3：()注射化學治療藥物期間，避免使用注射的手拿東西或提重物？

正確答案

問題1：○ 問題2：○ 問題3：○

編印單位：護理部 10D (Oncology-037)

編印日期：2013 年 06 月 05 日第 1 版

修訂日期：2024 年 03 月 20 日第 3 版

全院編碼：亞東醫院出版品 (SH979)

材物編碼：MS4905Z710

宗旨：持續提升醫療品質

善盡社會醫療責任

願景：成為民眾首選的醫學中心