



何謂失智症（分類及早期症狀）

失智症是一組疾病的總稱，也有人稱之為失智症候羣（dementia syndrome），主要是由於大腦功能減退或錯亂引致認知功能障礙，同時因此影響病患日常生活功能，在這種情況下病人被廣稱之為可能患有失智症。

失智症候羣之綜合症狀可由許多疾病引起，如腦部退化性疾病之阿茲海默症及巴金森氏症後期、腦中風、內分泌紊亂、腦部感染、大腦損傷、正常腦壓水腦症及腦瘤等。雖然失智症的起因並不相同，但這組疾病有許多相似的徵狀，比如常見的記憶力減退、忘東忘西、忘記剛剛做過的事、重複發問和判斷力差及對時間弄不清楚等。

1. 阿茲海默症(Alzheimer)：

是失智症中最常見的一種退化性的疾病，佔所有失智症60%以上，許多科學家認為此類患者的大腦內有類澱粉的沈澱，並出現腦細胞內神經纖維纏結及細胞外澱粉樣蛋白質塊兩種病理變化，引致細胞功能紊亂，細胞逐漸萎縮、死亡。其典型之起始症狀為短期記憶障礙，病人會遺忘剛剛發生的事，而較久以前的記憶(長期記憶)則相對不受影響。

2. 血管性失智症：

由於腦中風或慢性腦血管病變，造成腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡及智能減退，影響日常生活能力，這是造成失智症的第二大原因。臨床表現通常是突發性的，而且智能減退的情形，會因再次中風呈“階梯式”變壞，越來越差。

3. 其他退化性失智症：

巴金森氏症之病患者有 40%後期會同時患有失智症，而亨汀頓氏症病人患病後期也會出現智能減退的現象。

4. 其他失智症：

- (1) 顱內病灶：正常腦壓水腦症、腦部腫瘤等。
- (2) 新陳代謝疾病：甲狀腺功能過低症、慢性肝、腎及肺疾病、缺氧性腦病變等。
- (3) 中樞神經感染：神經性梅毒、愛滋病、庫賈氏症等。
- (4) 營養失調：維他命 B12 缺乏症候羣。
- (5) 藥物過量：長期酗酒、慢性藥物成癮、重複服藥、慢性重金屬中毒等。
- (6) 假性失智：憂鬱症。

諮詢服務電話

(02)7728-2533(失智中心)

(02)8966-7000 轉 1298(神經醫學部)

亞東紀念醫院 祝您健康

編印單位：神經醫學部
編印日期：2022年09月01日 第3版
全院編碼：亞東醫院出版品 SH323

宗旨：持續提升醫療品質
善盡社會醫療責任
願景：成為民眾首選的醫學中心