

化學治療靜脈給藥注意事項

壹、為維護您在化學治療靜脈給藥時的安全與舒適，請注意以下事項：

一、化療前：

- (一)請穿著開前襟、寬袖(避免穿束袖口)的衣服，以方便評估注射部位。
- (二)治療前，請先解小便，需要時可將尿壺或便盆備於床旁，亦可將護士呼叫鈴放於身旁，以便使用。

二、化療中：

- (一)注射化學治療藥物時，若需下床，請務必維持管路固定，避免拉扯或折到。
- (二)減少注射針拉扯之動作，避免將手臂高舉過頭、撿拾物品，請用未被注射的手做事(如：拿話筒)，如需穿脫衣服，請告知護理師協助更換。
- (三)注射化學治療藥物時，勿碰觸或磨擦靜脈注射週邊部位。
- (四)如有使用點滴幫浦控制滴數時，請勿自行調整機器，機器發出聲響時，請立刻通知護理師。
- (五)若您若發現所使用的活動點滴架推起來不順暢，請立即向護理站反應。

三、化療後：

- (一)在化學治療靜脈給藥正常輸注時，注射部位應該不會感到疼痛或不舒服。假如有下列情形，請立即通知醫護人員或立即返回醫院處理：
 - 1. 注射部位有灼熱感、發紅、腫脹、刺痛感、導管輸注座移位、皮膚有濕濕的感覺。
 - 2. 點滴速度突然變得不流暢。
 - 3. 靜脈管路有被扯動的情形。
- (二)輸注結束後，觀察注射部位周圍皮膚至隔日，如有腫脹、發紅、局部發熱、疼痛等不適，請立即告知醫護人員或返回醫院處理。

貳、諮詢服務電話

(02) 8966-7000 轉 4001 (血液腫瘤科病房)

(02) 8966-9000 (預約掛號專線)

參、參考文獻：

陳婷婷、標瓊喜、賴妙惠、葉婉真(2018)提升護理人員執行首次居家化療病人使用攜帶式輸液器衛教指導完整率。榮總護理 35(3)，302-313。

Jan Buter, Katherine T Steele, Kevin C Chung, Kate Elzinga(2020)

Extravasation injury from chemotherapy and other non-antineoplastic vesicants, *Up ToDate*.Retrieved May 12.2021 from

https://www.uptodate.com/contents/extravasation-injury-from-chemotherapy-and-other-non-antineoplastic-vesicants?search=Extravasation%20injury&source=search_result&selectedTitle=1~82&usage_type=default&display_rank=1#H548740882

肆、複習一下

問題1：()滴注化學治療藥物時注射部位會痛，要跟護理師說？

問題2：()化學治療結束後，需觀察注射部位周圍皮膚至隔日，如有腫脹、發紅、局部發熱、疼痛等不適，請立即告知醫護人員或返回醫院處理。

問題3：()注射化學藥物期間，避免使用注射的手拿東西或提重物？

正確答案

問題1：○ 問題2：○ 問題3：X

編印單位:護理部 10D (Oncology-037)

編印日期: 2013 年 06 月 05 日第 1 版

修訂日期: 2021 年 10 月 31 日第 2 版

全院編碼:亞東醫院出版品 (SH979)

材物編碼: MS4905Z710

宗旨:持續提升醫療品質

善盡社會醫療責任

願景:成為民眾首選的醫學中心