



# 全球尚未根除瘧疾



## 旅遊前、中、後小心被瘧

### 出國前一個月-前往 旅遊醫學門診

- 評估旅遊地感染風險
- 依指示服用瘧疾預防性用藥

### 旅遊期間-做好防蚊措施

- 穿著淺色長袖衣褲
- 使用政府核可含DEET或Picaridin成份之防蚊液
- 選擇有紗門、紗窗的住所或使用蚊帳

### 返國後-自主健康管理

- 離開瘧疾風險區後7天至3周內(最長一年內)若出現間歇性發熱、發冷等，應就醫並鑑別診斷瘧疾
- 告訴醫師旅遊史及是否曾服用瘧疾預防性用藥

# 防蚊液成分大PK

**DEET** **Picaridin**  

兼顧防蚊&安全 叫我防蚊第一名

種類	 <b>DEET</b> 敵避	 <b>Picaridin</b> 派卡瑞丁	 樟腦油
防蚊效果	佳	佳	無
安全性	佳 注意成人、小孩 使用濃度不同	佳	差
適用範圍	> 2個月嬰兒	> 2歲幼童	不可塗抹皮膚
政府核可 可噴灑 於皮膚	✓ 衛福部 環保署	✓ 環保署	✗
政府核可 可噴灑 於環境	✓	✗	✓