



流行性腦脊髓膜炎 高風險地區

腦膜炎雙球菌的感染為世界性，最主要的流行地區位於撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」。

人口聚集場所 (如學校、宿舍及軍營等) 或活動也較容易造成疾病傳播，過去伊斯蘭教朝覲曾發生流行疫情。

疫苗介紹

目前國內使用之疫苗為四價流行性腦脊髓膜炎結合型疫苗，是一種不活化疫苗。**接種後約7~10天可產生保護力，保護力可維持5年。**

疫苗之接種年齡及劑次依接種之疫苗廠牌而有所不同，請至疾病管制署全球資訊網

(<https://www.cdc.gov.tw>) 「國際旅遊與健康」>「旅遊醫學」>「國際預防接種及藥物」>「流行性腦脊髓膜炎疫苗」項下查詢。



國際旅遊處方箋

不可接種對象

對疫苗成分過敏者。

需特別留意的接種對象

1. 免疫力不全患者、或正在接受免疫抑制治療者，可能無法產生足夠免疫保護力。
2. 在孕婦及哺乳中婦女之使用經驗有限。
3. 血小板低下或凝血功能異常者。
4. 高燒或罹患急性感染症者，建議暫緩接種。



認識流行性腦脊髓膜炎

流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，好發於冬、春二季(11月至隔年3月)。

透過飛沫及接觸傳染

通常是直接接觸到患者喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫造成感染。



感染症狀

大部分感染後無症狀或僅有輕微的上呼吸道症狀，但嚴重者也可能引起肺炎、敗血症和腦膜炎，發作時會突然出現發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直，畏光或精神錯亂等腦膜炎症狀，致死率約10%-15%；亦可能出現出血性皮疹、瘀斑及休克等敗血症症狀，致死率可達40%。

潛伏期

感染腦膜炎雙球菌後，約2-10日會出現症狀，**大部分為3-4日**。

預防方式

接種流行性腦脊髓膜炎疫苗，在高風險地區保持個人衛生、戴口罩，避免接觸有呼吸道症狀病人。



入境預防接種規定

目前僅有沙烏地阿拉伯針對朝覲(Hajj)、副朝覲(Umrah)者及利比亞、甘比亞針對入境者，要求必須具備有效之國際預防接種證明書(須於入境前10日以上接種)。



疾病管制署全球資訊網
www.cdc.gov.tw



1922防疫達人
www.facebook.com/TWCDC



Taiwan CDC
LINE@疾管家

防疫專線：☎1922

預防針有效 流行性腦脊髓膜炎



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC